

ORGANİK TOPRAK DÜZENLEYİCİ ÜRÜNLER SIVI KARIŞIM TOPRAK DÜZENLEYİCİ GÜBRE

BAZA HUMUS SC

Garanti Edilen İçerik (%w/w)	
Organik Madde	%20
Toplam(Humik+Fulvik) Asit	%20
pH	3-5

FİRMA BEYANI: Ürünün ambalajında verilmiş olan bilgiler, analizi ile sınırlı olup kullanımı işe kontrolümüz dışındadır. Bu sebepten dolayı satıcı, kullanımdan ve depolanmasından doğan herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Talimatlarımız dışındaki kullanımlar için ön deneme yapılması tavsiye edilir.

DEPOLAMA DURUMU: Kuru şartlar altında (minimum +5°C ile maksimum + 40°C) depolandığı takdirde ürünün fiziksel ve kimyasal özelliklerinde tolerans dışında bir değişiklik olmaz. Serin ve kuru alanlarda, gıda ve yiyeceklerden, su kaynaklarından uzak yerlerde, alışıp izgaralar üzerinde depolanmalı ve iyi bir havalandırma sağlanmalıdır. muhafaza ediniz.

TAŞIMA TALİMATI: Elle taşıma esnasında eldiven giyiniz. Deri ve göz temasından kaçınız. Gübre ile temas eden vücut kısımlarını bol su ile yıkayınız.

DİKKATI

KULLANMADAN ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.

ÇOCUKLARDAN VE GIDALARDAN UZAK TUTUNUZ.

GÖZ, YÜZ VE DERİ İLE TEMASINDAN KAÇININIZ.

GÜBRELEME ESNASINDA MASKE, ELDIVEN VE GÖZLÜK KULLANINIZ.

KULLANILMIŞ OLAN BOŞ AMBALAJLARI BAŞKA AMAÇLARLA KULLANMAYIP İMHA EDİNİZ.

TOPRAK VE/VEYA YAPRAK ANALİZİ YAPTIRILARAK GÜBRE KULLANILMASI TAVSİYE EDİLİR



Piyasaya sunacağımız **BAZA HUMUS SC** adlı ürünün etiketinin Yönetmeliğine uygun olarak hazırlandığını ve piyasada bu etiketin kullanılacağını beyan eder, aksi takdirde 4703 Sayılı Kanun gereğince yapılacak tüm soruşturma ve cezai müeyyideleri peşinen kabul ederiz.

ÜRÜN	YAPRAK UYGULAMALARI	TOPRAK UYGULAMALARI
Örtü Altı ve Açıkta Yetiştirilen Sebzeler	Bittler 20-25 cm boya ulaşmışınca 100 lt suya 50 cc dozunda yapraklara pülverize edilir.	Fideler saşırıldıktan sonra dekara 1 lt dozda uygulama yapılır. 15-20 gün ara ile 0.5 lt dozunda uygulamaya devam edilir.
Muz	1.Uygulama: Seker pancarı 5-6 yapraklı devredeyken dekara 200cc dozda yeterli miktar su ile karıştırılarak yapraklara pülverize edilir. 2.Uygulama: Dekara 200 cc dozda, pancar sıra arasını kapatmadan hemen önce yapraklara pülverize edilir.	Toprak ekime hazırlandıktan sonra dekara 400cc dozda yeterli miktarda su ile karıştırılarak toprağa pülverize edilir. Sıra üzerine uygulama yapılacaksa: ekimi takiben dekara 200cc dozda sıra üzerine bant şeklinde pülverize edilir.
Seker Pancarı, Kırmızı Pancar	1.Uygulama: Bittler 20-25 cm yüksekliğe erişince dekara 50cc dozda uygulanır. 2.Uygulama: birinci uygulamadan 15-20 gün sonra tekrarılanır	Toprak ekime hazırlandıktan sonra dekara 400cc dozda yeterli miktarda su ile karıştırılarak toprağa pülverize edilir. Damla veya sulama suyuna da dekara 250cc hesabı ile kullanılır. Sezon boyunca 1-3 kez tekrarlanır.
Diğer yumrulu Bittler(Patates, Soğan, Havuç vs)	1.Uygulama: Bittler 20-25 cm yüksekliğe erişince dekara 50cc dozda uygulanır. 2.Uygulama: birinci uygulamadan 15-20 gün sonra tekrarılanır	Toprak ekime hazırlandıktan sonra dekara 400cc dozda yeterli miktarda su ile karıştırılarak toprağa pülverize edilir. Damla veya sulama suyuna da dekara 250cc hesabı ile kullanılır. Sezon boyunca 1-3 kez tekrarlanır.
Tarla Bittlerinde (Pamuk, Mısır, Hububat vs.)	1.Uygulama: Bittler 20-25 cm yüksekliğe erişince dekara 50-100 cc dozda tek başına veya yaprak gübreleri, bitt gelişim düzenleyicileri ve pestisitlere aynı dozda katılarak kullanılır. 2.Uygulama: gerekirse 20 gün sonra aynı dozda tekrarılanır.	Toprak ekime hazırlandıktan sonra dekara 400cc dozda yeterli miktarda su ile karıştırılarak toprağa pülverize edilir. Damla veya sulama suyuna da dekara 250cc hesabı ile kullanılır. Sezon boyunca 1-3 kez tekrarlanır.
Meyve Bahçeleri	Yaprak gübreleri, bitt gelişim düzenleyicileri veya pestisitlere 100 lt suya 50 cc dozunda katılarak onların uygulamaları esnasında doğrudan yapraklara pülverize edilir	Vejetatif gelişme başlayınca ağaç başına 10 lt suya 25cc dozunda ağacın taç izdüşümüne gelecek şekilde toprağa verilir. Damlama sulama veya sulama suyuna katılarak 250cc'da uygulanır.
Yumusak ve taş çekirdekli Meyveler	Yaprak gübreleri, bitt gelişim düzenleyicileri veya pestisitlere 100 lt suya 50 cc dozunda katılarak onların uygulamaları esnasında doğrudan yapraklara pülverize edilir	Yeni tesis edilen bahçelerde fidan gelişim döneminde dekara 1lt dozunda uygulama yapılır. Yetişkin bahçelerde çiçek öncesi ve sonrası meyve gelişim dönemi olmak üzere 1-3 lt dozunda kullanılır.
Narenciye		

LİSANS NO:
TESCİL NO:
PARTİSERİ NO:
ÜRETİM TARİHİ:
SON KULLANMA TARİHİ:
NET AĞIRLIK:

BAZACHEM TARIM A.Ş.
AKKUYYU MAH. 1045 SK. UMUT PARK KONAĞI 2. A
SİĞİRİ A. ÇIKIŞI NO: 2442 KONYAALTI / ANTALYA
A. ÇIKIŞI NO: 2442 KONYAALTI / ANTALYA
Mersis No: 016015550800001 Ttc. Sic. No: 112966

ÜRETİCİ FİRMA:

BAZACHEM TARIM ANONİM ŞİRKETİ
AKKUYYU MAH. 1045 SK. UMUT PARK KONAĞI A
NO: 2 A İÇ KAPİ NO: 2 KONYAALTI / ANTALYA