




EC FERTİLİZER
KALSİYUM KLORÜR ÇÖZELTİSİ

BAZACAL

GARANTİ EDİLEN İÇERİK	%(w/w)
Suda Çözünür Kalsiyum oksit (CaO)	% 12
Suda Çözünür Bor (B)	% 0,2

NET
MİKTAR **20 L**



Kullanmadan
önce çalkalayınız



KULLANILMASI:

KULLANILACAK BİTKİ	KULLANIM DOZLARI		KULLANIM ZAMANI
	Topraktan	Yapraktan Püskürtme	
SERA SEBZELERİ (Domates, Biber, Patlıcan, Hıyar, Kabak, Marul, Fasulye, Karpuz, Kavun, v.s.)	2-3 L / da	200-300 ml / 100 L su	Erken gelişme döneminde, meyveler ceviz büyüklüğünde, yumuşama ve çatlamaya karşı topraktan veya yapraktan uygulanabilir.
AÇIK TARLA SEBZELERİ	2-3 L / da	200-300 ml / da	Erken gelişme dönemlerinde, meyveler ceviz büyüklüğünde, yumuşama ve çatlamaya karşı topraktan veya yapraktan uygulanabilir.
MEYVE AĞAÇLARI (YUMUŞAK VE SERT ÇEKİRDEKLİLERDE), KİVİ NARENCİYE, NAR, ZEYTİN	2-4 L / da	250 ml / 100 L su	Meyve tutumundan 10-15 gün sonra, meyveler ceviz büyüklüğünde ve hasattan 1 ay öncesine kadar topraktan veya yapraktan uygulanabilir.
MUZ	2-3 L / da	-	Doğumdan önce, doğumdan sonra, meyve gelişim döneminde
BAĞ	2-3 L / da	250 ml / 100 L su	Danelere tatlı su yürümeye başladığında 15-20 gün ara ile 2-3 uygulama yapraktan ve topraktan uygulanabilir.
PAMUK	-	200-300 ml / da	Tarak teşekkülünde ilk uygulama, 15 gün sonra tekrarlanır.